

Aubun N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Aubun parece ser originario de Vaucluse.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Aubun

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Murescola» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En la Unión Europea, el Aubun puede denominarse oficialmente con otros nombres: Caricagiola (Italia), Castelina (España) et Corvo (Portugal).

Datos regulatorios

En Francia, el Aubun está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrito en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Italia y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales con base en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar poco abierto o cerrado y un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, ondulado entre los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada u ovoide.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1664	3284	5822	3664	1724	912	247

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	253	176	194	252	240	243	239
Allele 2	131	234	257	191	200	252	248	257	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Aubun posee un porte semi-erguido. Es una variedad fértil y bastante rústica.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Aubun llevan los números 168 y 350. En 2001 se plantó un conservatorio de 3 clones en el departamento de Vaucluse.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. En condiciones fértiles, esta variedad tiene dificultades para producir color y los grados son bajos. Los vinos tintos obtenidos suelen ser vulgares y sin finura, pero esta variedad puede producir unos vinos rosados agradables.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad no sufre en exceso los efectos de la podredumbre gris y al oídio. Por el contrario, su sensibilidad al mildiu y los cicadélidos es bastante elevada.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*