

# Aubun N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Aubun parece ser originario de Vaucluse.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Aubun

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Murescola» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En la Unión Europea, el Aubun puede denominarse oficialmente con otros nombres: Caricagiola (Italia), Castelina (España) et Corvo (Portugal).

## Datos regulatorios

En Francia, el Aubun está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrito en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Italia y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales con base en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar poco abierto o cerrado y un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, ondulado entre los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada u ovoide.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1664	3284	5822	3664	1724	912	247

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	253	176	194	252	240	243	239
Allele 2	131	234	257	191	200	252	248	257	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Aubun posee un porte semi-erguido. Es una variedad fértil y bastante rústica.

### Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Aubun llevan los números 168 y 350. En 2001 se plantó un conservatorio de 3 clones en el departamento de Vaucluse.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. En condiciones fértiles, esta variedad tiene dificultades para producir color y los grados son bajos. Los vinos tintos obtenidos suelen ser vulgares y sin finura, pero esta variedad puede producir unos vinos rosados agradables.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad no sufre en exceso los efectos de la podredumbre gris y al oídio. Por el contrario, su sensibilidad al mildiu y los cicadélidos es bastante elevada.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*