

Segalin N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1957 a partir de un cruce entre el Jurançon noir y el Portugais bleu.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Segalin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Segalin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares, de color verde oscuro, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales con fondo en U, un seno peciolar en U, cerrado o de lóbulos ligeramente superpuestos, con fondo a menudo limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes cortos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	15	65	72	58

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	255	178	202	260	238	233	239
Allele 2	149	232	262	188	204	260	248	259	251

Cultivo y habilidades agronómicas

En zonas meridionales, el Segalin es una variedad poco vigorosa. Se adapta mejor a las zonas más templadas, donde se puede manejar en poda larga moderada y en tutores. El Segalin es sensible al desecado de los escobajos y a las carencias de magnesio, en especial, si se injerta en SO4.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Segalin lleva el número 745.

Fenología


Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Potencial tecnológico

Los racimos son medianos, mientras que las bayas son muy pequeñas. El Segalin permite elaborar vinos con buen color, estructurados y tánicos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Segalin no es demasiado sensible a la podredumbre gris.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier