

Servanin N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Servanin es originario del norte de Isère.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Servanin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Servanin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar muy abierto y con base en U o en V, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos erguidos y una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2018
ha	376	344	21	10	1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	239	176	188	256	240	216	239
Allele 2	141	234	260	186	194	260	254	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Servanin es una variedad muy vigorosa, bastante fértil, pero sensible al millerandaje. Por eso, algunas bayas siguen estando verdes al alcanzarse el punto de maduración óptimo. El Servanin suele cultivarse en cepas de gran desarrollo. Se adapta bien a los terrenos calcáreos o con marga.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Servanin lleva el número 1153.

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. El Servanin produce unos vinos tánicos con un color excelente, pero ácidos y de bajo grado alcohólico.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Servanin es sensible al mildiu, pero tolera bien la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*