

Sultanine B

Variedad de uva de mesa.



Origen

Esta variedad de uva de mesa de origen natural se cultiva en numerosos países.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Sultanine

Sinonimia

En la Unión Europea, la Sultanina es oficialmente denominada con otros nombres: Sultanina (Bulgaria, España, Portugal), Sultanina bianca (Italia) y Soutlanina (Grecia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, la Sultanine está oficialmente inscrita en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Croacia, España, Grecia, Italia y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja o muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes amarillas y brillantes,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con un seno peculiar de lóbulos superpuestos o muy superpuestos, dientes cortos a medianos, de lados rectilíneos, aquellos correspondientes a los nervios principales son un poco más largos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo liso, fino, brillante, con bordes hacia el haz, ocasionalmente abultado, plisado en el peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica alargada u ovoide.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	143	232	239	178	188	248	238	216	249
Allele 2	149	232	253	191	188	260	248	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

La Sultanine es una variedad extremadamente vigorosa, con un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizada y manejarse en poda larga. Para obtener una correcta iniciación floral, la Sultanine precisa unas condiciones de luz y temperatura muy favorables. Por este motivo, en Francia, su fertilidad suele ser nula o muy baja.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Sultanine lleva el número 919.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas a 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, alados y moderadamente compactos. Las bayas son apirenas, medianas con una piel de grosor medio y una pulpa crujiente de sabor simple, agradable y poco ácido. Para la producción de uvas de mesa, los tratamientos con ácido giberélico y la práctica de la incisión anular permiten aumentar el tamaño de las bayas. La Sultanine es también la variedad principal utilizada para la producción de uvas pasas.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Sultanine es muy sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, a la podredumbre gris, así como a la excoriosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*