Tannat N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de los viñedos pirenaicos.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Tannat

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Tannat está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Grecia, Italia y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, de gran tamaño, pentagonales, enteras, de tres o cinco lóbulos, con un lóbulo central alargado, un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes cortos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, con hinchazón, en ocasiones ondulado entre los nervios principales y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	4192	3925	3256	2891	2931	3147	2837

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	236	249	182	194	240	254	233	239
Allele 2	153	238	249	186	200	252	254	243	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Tannat es una variedad bastante vigorosa que suele manejarse en poda larga y que debe ser empalizada.

Selección clonal en Francia

Los doce clones autorizados de Tannat llevan los números 398, 399, 472, 473, 474, 475, 717, 794, 944, 1048, 1154 y 1175. En 1995, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de más de 300 clones en Pirineos Atlánticos.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, mientras que las bayas son pequeñas a medianas. El Tannat produce unos vinos de gran color, muy tánicos y nerviosos (con una acidez ligeramente dura). Esta variedad permite elaborar vinos tintos de calidad, potentes, estructurados y aptos para el envejecimiento.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Tannat es sensible a los ácaros y a los cicadélidos. También es un poco sensible a la podredumbre gris.


Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados