

# Tempranillo N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Tempranillo es una variedad de origen español (Rioja). Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Albillo Mayor y el Benedicto.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Tempranillo

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Tempranillo es oficialmente denominado con otros nombres: Aragonez (Portugal), Tinta roris (Chipre) y Tinto tempranillo (Chipre). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Tempranillo está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, España, Grecia, Italia, Malta y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada a muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas pentagonales, de gran tamaño, de color verde azulado, de cinco lóbulos, con el lóbulo central alargado, senos laterales profundos, un seno peciolar de lóbulos superpuestos, dientes medianos a largos de lados rectilíneos, un limbo alabeado, ondulado entre los nervios cerca del peciolo o ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos en los nervios y una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1979	1988	1998	2008	2018
ha	551	2341	1556	1127	373

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	234	239	180	196	248	240	257	249
Allele 2	143	234	253	180	200	252	254	257	251

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante rústica y vigorosa. Se adapta bien a las zonas meridionales, pero sus sarmientos son quebradizos y es sensible al viento. Su carácter precoz permite ampliar la zona de cultivo (zonas climáticas más frescas) o realizar la vendimia antes de las lluvias del equinoccio. Presenta una fertilidad suficiente para manejarse en poda corta, pero a veces presencia cierta alternancia.


### Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Tempranillo llevan los números 770, 771 y 776.


### Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*