Tempranillo N

Variedad de uva de vino.







Origen

El Tempranillo es una variedad de origen español (Rioja). Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Albillo Mayor y el Benedicto.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Tempranillo

Sinonimia

En la Unión Europea, el Tempranillo es oficialmente denominado con otros nombres: Aragonez (Portugal), Tinta roris (Chipre) y Tinto tempranillo (Chipre). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Tempranillo está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, España, Grecia, Italia, Malta y Portugal.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada a muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas pentagonales, de gran tamaño, de color verde azulado, de cinco lóbulos, con el lóbulo central alargado, senos laterales profundos, un seno peciolar de lóbulos superpuestos, dientes medianos a largos de lados rectilíneos, un limbo alabeado, ondulado entre los nervios cerca del peciolo o ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos en los nervios y una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1979	1988	1998	2008	2018
ha	551	2341	1556	1127	373

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	234	239	180	196	248	240	257	249
Allele 2	143	234	253	180	200	252	254	257	251

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante rústica y vigorosa. Se adapta bien a las zonas meridionales, pero sus sarmientos son quebradizos y es sensible al viento. Su carácter precoz permite ampliar la zona de cultivo (zonas climáticas más frescas) o realizar la vendimia antes de las lluvias del equinoccio. Presenta una fertilidad suficiente para manejarse en poda corta, pero a veces presencia cierta alternancia.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Tempranillo llevan los números 770, 771 y 776.

Potencial tecnológico

Los racimos son grandes (alargados) y las bayas de tamaño mediano. En terruños favorables, el Tempranillo permite obtener vinos de calidad, muy agradables, de color correcto y estructurados, pero que carecen de acidez en zonas cálidas. La calidad y el grado alcohólico descienden cuando el rendimiento es excesivo.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Tempranillo es poco sensible a la podredumbre gris. Se muestra sensible principalmente a la eutipiosis y a los cicadélidos.

Fenología


Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados