

# Bachet N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad originaria del noreste de Francia (Aube) sería, según los análisis genéticos publicados, el resultado de un cruce entre el Gouais blanc y el Pinot.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Bachet

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Bachet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- al pámpano con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas enteras con un seno peciolar abierto, en V o en U, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, en ocasiones, con bordes ligeramente hacia el envés, con hinchazón suave y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2018
ha	1	4	1	0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	232	243	176	188	238	248	227	271
Allele 2	149	236	249	186	204	246	254	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad con un vigor óptimo es bastante productiva. Parece tolerar bien las heladas invernales. Por el contrario, es sensible a la clorosis y tampoco tolera bien la sequía ni la asfixia radicular.

### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño pequeño. El Bachet produce unos vinos bastantes comunes, tanto relativamente alcohólicos y ácidos, como con un carácter herbáceo.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Bachet es sensible a las principales enfermedades: mildiu, oídio, podredumbre gris.

### Fenología


Época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana a 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*