Téoulier N

Variedad de uva de vino.





Origen

El Téoulier es una variedad de origen provenzal.
Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Pougayen y el Plant d'Entrechaux.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Téoulier

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Téoulier está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos a largos, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado con bordes hacia el envés, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	126	80	2	0.2

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	234	243	176	188	240	254	247	249
Allele 2	141	236	249	182	204	256	266	257	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Téoulier es una variedad de porte erguido que se puede manejar en poda corta tipo gobelet. Su desborre bastante precoz la expone a los riesgos de heladas de primavera.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Téoulier lleva el número 1200.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Téoulier permite elaborar vinos de color sostenido, pero que carecen de elegancia y finura. Estos vinos suelen presentar carencias de acidez y un grado alcohólico medio.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Téoulier se muestra bastante sensible al oídio.


Fenología

época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.
época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados