


Terret noir N

Variedad de uva de vino.



Origen

La variedad Terret noir procede de Languedoc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Terret noir

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Terret noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con senos laterales superiores con base en U y lóbulos superpuestos, un seno peciolar poco abierto o cerrado de lóbulos superpuestos, dientes medianos de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	131	151	1149	808	623	273	65

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239

Cultivo y habilidades agronómicas

El Terret noir posee un porte erguido. Se adapta bien al manejo en gobelet o en cordón.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Terret noir lleva el número 1084.

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Terret noir produce vinos ligeros, de bajo grado alcohólico y carentes de color.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Terret noir es bastante sensible al mildiu y al oídio. Es también susceptible a las enfermedades de madera.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*