

Tourbat B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad parece ser originaria de Cataluña, pero también la encontramos en Cerdeña.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Tourbat

Sinonimia

En Italia, el Tourbat es oficialmente denominado "Torbato". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Tourbat está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos superpuestos o muy superpuestos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	112	141	10	14	20	33	32

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	243	176	186	248	254	235	239
Allele 2	149	238	249	178	188	252	254	257	271

Potencial tecnológico

los cicadélidos.

Los racimos son grandes, bastante abiertos y las

vinos ligeramente aromáticos y con cuerpo.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

bayas de medianas a grandes. En general, el Tourbat

conserva una acidez óptima al madurar. Produce unos

El Tourbat es bastante sensible al oídio, a los trips y a

Cultivo y habilidades agronómicas

El Tourbat posee un porte rastrero y de arbusto. Debe manejarse en poda corta y debe plantarse en suelos cálidos y secos. Por otra parte, es un poco sensible a las carencias de magnesio.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Tourbat llevan los números 911 y 987.


Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.


Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

renologia

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier