

# Tourbat B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad parece ser originaria de Cataluña, pero también la encontramos en Cerdeña.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Tourbat

## Sinonimia

En Italia, el Tourbat es oficialmente denominado "Torbato". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Tourbat está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas enteras, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos superpuestos o muy superpuestos, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|-----|------|------|------|------|------|------|------|

|    |     |     |    |    |    |    |    |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| ha | 112 | 141 | 10 | 14 | 20 | 33 | 32 |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|

## Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 1 | 141 | 229 | 243 | 176 | 186 | 248 | 254 | 235 | 239 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 2 | 149 | 238 | 249 | 178 | 188 | 252 | 254 | 257 | 271 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Tourbat posee un porte rastrero y de arbusto. Debe manejarse en poda corta y debe plantarse en suelos cálidos y secos. Por otra parte, es un poco sensible a las carencias de magnesio.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, bastante abiertos y las bayas de medianas a grandes. En general, el Tourbat conserva una acidez óptima al madurar. Produce unos vinos ligeramente aromáticos y con cuerpo.

### Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Tourbat llevan los números 911 y 987.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Tourbat es bastante sensible al oídio, a los trips y a los cicadélidos.

### Fenología


Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*