Verdesse B

Variedad de uva de vino.







Origen

La Verdesse es originaria de Isère. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería directamente emparentada con el Savagnin.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Verdesse

Sinonimia

En Italia, el Verdesse es oficialmente denominado "Bian ver". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, la Verdesse está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, de pequeño tamaño, orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales profundos, un seno peciolar en U abierto o cerrado, dientes medianos de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antociánica baja a media de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	19	12	2	3	2	2	10.4

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	176	188	246	240	233	239
Allele 2	149	229	257	186	194	250	248	247	249

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad debe manejarse en poda larga. Ofrece buenos resultados en cantizales arcilloso-calcáreos.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Verdesse llevan los números 931 y 1303. En 1999, se creó un conservatorio de una decena de clones en los viñedos de Saboya.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son pequeños a medianos. La Verdesse produce unos vinos generosos y vivos, marcados por aromas vegetales y florales.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Verdesse es poco sensible a la podredumbre gris, pero teme al oídio y al mildiu.


Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados