

Villard noir N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Villard noir (híbrido interespecífico) procede del cruce entre el Chancellor (7053 Seibel) y el Subéreux (6905 Seibel).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Villard noir

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "18315 Seyve-Villard" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Villard noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que es semi-abierta, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes brillantes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de pequeño tamaño, orbiculares o cuneiformes, enteras, con un seno peciolar en U o V poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos a largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, plegado en canalón, muy abultado y, en el envés del limbo, una densidad nula o baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica u ovoide.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1998	2008	2018
ha	27174	30375	7785	3245	1679	960

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	137	223	237	184	178	250	242	235	255
Allele 2	141	232	260	186	202	262	254	237	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Villard noir es una variedad moderadamente vigorosa, muy fértil, con un porte semi-erguido que puede manejarse en poda larga moderada.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Villard noir lleva el número 1202.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El potencial en azúcares de esta variedad es óptimo y el Villard noir permite elaborar vinos de calidad corriente, de color correcto y con presencia de antocianinas diglucósidas.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Villard noir es resistente al mildiu y bastante resistente al oídio. Por el contrario, es un poco sensible antracnosis, a la podredumbre gris y debe injertarse.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*