

# Gamaret N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1970 en la estación de Changins en Suiza y es el resultado de un cruce entre el Gamay y el Reichensteiner.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Gamaret

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Gamaret está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Italia.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar en V, abierto o poco abierto, dientes pequeños, cortos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

46

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	178	194	242	238	216	239
Allele 2	149	232	257	178	194	260	248	247	263

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Gamaret es una variedad bastante vigorosa, de fertilidad regular y porte semi-erguido a horizontal. Se recomienda la poda corta y el uso de espalderas. Además, se muestra un poco sensible a la sequía y, en condiciones propicias al estrés hídrico, la elección del portainjerto debe tener este aspecto en cuenta.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Gamaret lleva el número 1117.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Gamaret son pequeños a medianos y con una compacidad baja a moderada. Las bayas son también pequeñas a medianas. El potencial de acumulación en azúcares es moderado a óptimo, con una acidez moderada. El Gamaret se adapta bien a la vinificación en racimos enteros que han alcanzado la maduración plena; esta variedad permite elaborar unos vinos de guarda equilibrados, especiados y apreciados por su color intenso y su estructura tánica.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Gamaret es poco sensible al black rot y a la podredumbre gris, pero es un poco sensible al oídio y mildiu, así como a la flavescencia dorada y a la yesca.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*