

# Red Globe Rg

### Variedad de uva de mesa.



### Origen

Esta variedad de uva de mesa fue obtenida en California por H.P. Olmo y A.T. Koyama.

#### Usar

Variedad de uva de mesa.

### Nombre de la variedad en Francia

Red Globe

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Red Globe está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: España, Portugal e Italia.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas o cobrizas,
- a los pámpanos herbáceos con estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes o pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales de lóbulos superpuestos, un seno peciolar poco abierto en V o en llave, dientes medianos en relación a su base, abundantes, de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o ligeramente alabeado, liso y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 0

### Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	234	239	178	186	248	248	257	251
Allele 2	149	236	249	178	188	260	254	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Red Globe es una variedad de vigor medio, con una fertilidad también media, pero de productividad elevada y un porte semi-erguido. La densidad de follaje del Red Globe es moderada, lo que permite una coloración uniforme de las uvas, sin necesidad de deshojado previo a la recolección. Los racimos se conservan bien en la cepa, pero pueden ser sensibles al desecado y al tostado en función de la exposición.

### Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Red Globe lleva el número 6012.

### Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Debourrement




### Potencial tecnológico

Los racimos del Red Globe son grandes y abiertos, con un pedúnculo largo. Las bayas son grandes a muy grandes, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio a elevado, gran presencia de pruina y una pulpa firme y poco jugosa. Las uvas poseen una buena aptitud para la conservación en frío y resisten bien el transporte.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Red Globe es un moderadamente sensible al mildiu y al oídio. Por el contrario, es muy sensible a la excoriosis.

### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Nouvelles variétés de raisins de table et de raisins secs. Oficina Nacional de la Vid y el Vino (OIV), 1988, Francia.
- Variedades de Uva de Mesa en Andalucía. A. García de Lujàn y M. Lara Benítez, 1998, Ed. Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura y Pesca, España.
- Reconnaître les variétés de raisin de table. Ed. Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), 2001, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier