Victoria B

Variedad de uva de mesa.







Origen

Esta variedad de uva de mesa fue obtenida en 1964 en Rumanía por V. Lepadatu y Condei mediante el cruce entre el Cardinal y el Dattier de Beyrouth.

Usar

Variedad de uva de mesa.

Nombre de la variedad en Francia

Victoria

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Victoria está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, Italia y Rumanía.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a los pámpanos herbáceos e color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar abierto y fondo en U, dientes grandes, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	0

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	239	182	186	244	254	233	251
Allele 2	133	234	249	182	188	252	254	267	257

Cultivo y habilidades agronómicas

El Victoria posee un vigor muy elevado y un porte semi-erguido. Es una variedad que debe ser empalizada y que puede manejarse en poda corta o en poda larga.

Potencial tecnológico

Los racimos del Victoria son medianos a grandes, moderadamente compactos y con buena presentación. Las bayas son grandes con una piel gruesa y una pulpa jugosa.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Victoria llevan los números 6009 y 6010.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Victoria es poco sensible a la podredumbre gris.

Fenología

Época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Registro nazionale delle varieta di vite. Ministère de l'agriculture italien [página web, consultada en 2020].

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados