


# Alvarinho B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de la costa oeste de la Península Ibérica.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Alvarinho

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Alvarinho es oficialmente denominado con otros nombres: Albariño (España) y Albarina (Malta). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Alvarinho está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: España, Malta y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos largos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares, con bordes ligeramente hacia el envés, enteras, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada, con mucha pruina.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

42

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	219	239	186	186	248	238	233	239
Allele 2	149	229	239	186	204	252	254	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Alvarinho es una variedad de vigor moderado, con un porte horizontal y que debe ser empalizada cuidadosamente. Es poco productiva y precisa una poda larga. Está adaptada a los suelos ácidos, graníticos y a los terrenos arenosos.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Alvarinho lleva el número 1143.

### Fenología

Época de desborre: 7 días antes de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Alvarinho son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. El potencial en azúcares es medio y esta variedad permite elaborar unos vinos apreciados, aromáticos (albaricoque, menta, etc.), refinados y con una buena acidez.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Alvarinho es poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*