Arvine B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria de la región de Valais en Suiza.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Arvine

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Petite Arvine» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Italia, esta variedad también puede denominarse oficialmente «Petite Arvine».

Datos regulatorios

En Francia, la Arvine está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas medianas a grandes, anchas, orbiculares o pentagonales, enteras o de tres lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado o de lóbulos superpuestos, dientes cortos de lados rectilíneos o convexos, un limbo ligeramente abultado o plisado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	2018
ha	4.7

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	257	182	194	240	240	235	239
Allele 2	149	236	262	186	194	252	248	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

La Arvine es una variedad de vigor medio que debe ser empalizada y manejarse en poda larga moderada. La Arvine está adaptada a los suelos con guijarros, moderadamente fértiles.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Arvine lleva el número 6001.

Potencial tecnológico

Los racimos de la Arvine son pequeños y compactos y las bayas son pequeñas. El potencial en azúcares es elevado y esta variedad permite elaborar unos vinos robustos, aromáticos (flor, miel, etc.), refinados y con una buena acidez.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Arvine es sensible al mildiu. También es sensible a la podredumbre gris al final de la maduración.


Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados