


Monbadon B

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad tradicionalmente cultivada en el oeste de Francia (Charente, Gironda), según los análisis genéticos publicados, sería el resultado de un cruce entre el Ugni blanc y la Folle blanche.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Monbadon

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Monbadon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2011, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde amarillento o con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales profundos con fondo en U y un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el haz, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada, en ocasiones, ligeramente achatada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	1786	1254	129	2.5

Perfil genético

Microsatell	iteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	239	176	194	244	240	243	271
Allele 2	149	229	249	178	196	252	248	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Monbadon es una variedad muy productiva y de vigor moderado. El porte de los pámpanos es erguido.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Monbadon lleva el número 1258. En 2014 se instaló en Charente un conservatorio de unos cien clones.

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Monbadon son grandes a muy grandes, compactos y las bayas de medianas a grandes. Esta variedad permite elaborar unos vinos ácidos y de bajo grado alcohólico, neutros, habitualmente destinados a la destilación.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Monbadon es poco sensible al oídio y al mildiu. Por el contrario, es un poco más sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.
- Synonymie ampélographique de l'Ouest viticole français. Artozoul et al., 1960, Ed. INRA, Francia.
- Wine Grape Varieties. G.Kerridge y A. Anticliff, 1999, Ed. CSIRO, Australia.
- Cépages du Sud-Ouest, 2000 ans d'histoire. G. Lavignac, 2001, Ed. Rouergue/INRA, Francia.
- Wine Grape Varieties in California. L.J. Bettiga, 2003, Ed. UC Agriculture and Natural Resources, Estados Unidos.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier