

# Monbadon B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad tradicionalmente cultivada en el oeste de Francia (Charente, Gironde), según los análisis genéticos publicados, sería el resultado de un cruce entre el Ugni blanc y la Folle blanche.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Monbadon

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Monbadon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2011, en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde amarillento o con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales profundos con fondo en U y un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano o con bordes ligeramente hacia el haz, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada, en ocasiones, ligeramente achatada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	1786	1254	129	2.5

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	223	239	176	194	244	240	243	271
Allele 2	149	229	249	178	196	252	248	245	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Monbadon es una variedad muy productiva y de vigor moderado. El porte de los pámpanos es erguido.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Monbadon lleva el número 1258. En 2014 se instaló en Charente un conservatorio de unos cien clones.

### Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de Monbadon son grandes a muy grandes, compactos y las bayas de medianas a grandes. Esta variedad permite elaborar unos vinos ácidos y de bajo grado alcohólico, neutros, habitualmente destinados a la destilación.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Monbadon es poco sensible al oídio y al mildiu. Por el contrario, es un poco más sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.
- Synonymie ampélographique de l'Ouest viticole français. Artozoul et al., 1960, Ed. INRA, Francia.
- Wine Grape Varieties. G.Kerridge y A. Anticliff, 1999, Ed. CSIRO, Australia.
- Cépages du Sud-Ouest, 2000 ans d'histoire. G. Lavignac, 2001, Ed. Rouergue/INRA, Francia.
- Wine Grape Varieties in California. L.J. Bettiga, 2003, Ed. UC Agriculture and Natural Resources, Estados Unidos.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*