

Nebbiolo N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria del Norte de Italia (Piamonte).

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Nebbiolo

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Nebbiolo está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de pequeño tamaño, cuneiformes, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes pequeños de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo plano o hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	2008	2018
ha	0.5	0.5	1	4.4

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	153	229	247	182	194	244	238	235	239
Allele 2	153	234	249	186	200	252	240	267	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Nebbiolo es una variedad con pámpanos muy finos, con entrenudos alargados y numerosos rebrotes laterales. Debe manejarse en poda larga, con colocación muy cuidadosa en tutores y a una altura importante.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas de Nebbiolo son pequeños a medianos. En condiciones óptimas, esta variedad permite elaborar unos vinos de calidad excelente, relativamente ácidos, de color moderado y aptos para el envejecimiento.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Nebbiolo lleva el número 1190.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Nebbiolo es un poco sensible al oídio y a la podredumbre gris.


Fenología

Época de desborre: 6 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[página web](#), consultada en 2020].
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa. PG Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.
- Wine Grape Varieties. G. Kerridge y A. Anticliff, 1999, Ed. CSIRO, Australia.
- Wine Grape Varieties in California. L. Christensen et al., 2003, Ed. University of California Agriculture and Natural Resources, Estados Unidos.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*