

Saperavi N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Georgia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Saperavi

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Saperavi está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2012, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de tamaño mediano a grande, orbiculares, enteras o de tres o cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes medianos, de lados convexos u ocasionalmente rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica, de pulpa incolora pero con un pellejo de color intenso.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 5.1

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	221	239	186	188	244	238	234	243
Allele 2	143	238	239	189	200	262	240	243	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Saperavi es una variedad de vigor medio. El porte de los pámpanos es semi-erguido. Se recomienda la colocación en tutores. El Saperavi es una variedad bien adaptada a los fríos invernales, pero también a la sequía.

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Saperavi llevan los números 1187 y 1385.

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Saperavi son pequeños a medianos, con un pedúnculo ligeramente lignificado, y las bayas son medianas. Esta variedad, que se puede considerar como semi-tintorera, permite elaborar unos vinos potentes, de color intenso, ácidos y tánicos a la vez. También se puede utilizar para elaborar vinos dulces o vinos dulces naturales.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Saperavi no presenta sensibilidad particular a las enfermedades criptogámicas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Ampelografia Republicii Populare Romine. G. Constantinescu, 1959-1970, Ed. Academiei Republicii Populare Romine, Rumanía.
- Caucasus and Northern Black Sea Region Ampelography. D. Maghradze et al., 2012, Ed. Vitis, Alemania.
- Ampelographic Catalogue of Grape Varieties from Skra Collection. D. Maghradze et al., 2017, Ed. Vitis, Alemania.
- Ampélographie de l'URSS. A.M. Frolov-Bagreev et al., 1946-956, Ed. Kolos, Moscú, Rusia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier