

Kadarka N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Kadarka sería originario de los Balcanes o de Hungría.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Kadarka

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Gamza» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En Austria, Bulgaria, Croacia y Hungría, el Kadarka también se puede denominar oficialmente «Gamza».

Datos regulatorios

En Francia, el Kadarka está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2013, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los catálogos de otros países miembros de la Unión Europea: Austria, Bulgaria, C

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, con ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, medianas a grandes, orbiculares, enteras o con tres o cinco lóbulos, senos laterales poco profundos, un seno peciolar en V poco abierto o cerrado y que puede ser superpuesto, dientes bastante grandes, largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo grueso, con bordes hacia el haz, ocasionalmente alabeado, con hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y una densidad media a elevada de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	188	250	238	227	271
Allele 2	133	223	255	191	204	252	254	259	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Kadarka es una variedad vigorosa, productiva y de porte semi-erguido. Debe manejarse en poda corta para evitar la aglomeración de hojas y la acumulación de humedad en los racimos. En poca larga, esta variedad tiene tendencia a agotarse. Es tolerante a las condiciones de sequía, pero es sensible a las heladas invernales.


Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Kadarka lleva el número 1181.

Fenología

Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos del Kadarka son medianos y raramente alados. Las bayas también son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa jugosa. En condiciones climáticas favorables y, si los rendimientos están controlados, produce unos vinos aromáticos con una buena estructura tánica y una graduación alcohólica adecuada, pero con coloración deficiente. El Kadarka también se puede utilizar para elaborar vinos rosados y vinos dulces a partir de uvas pasificadas.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Kadarka es, sobre todo, sensible a la podredumbre gris en los racimos.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*