

# Muscat Bleu N

Variedad de uva de mesa.



## Origen

El Muscat Bleu o 83/2 Garnier es un híbrido interespecífico obtenido en los años '30 por M. Garnier en Ginebra (Suiza). Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, procedería de un cruce entre el 15/6 Garnier (Villard noir x Müller-Thurgau) y

## Usar

Variedad de uva de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Muscat Bleu

## Sinonimia

En Austria, esta variedad también se denomina oficialmente «Muskat bleu». Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Muscat Bleu está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2013 en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Austria.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula o muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas, con una densidad nula de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo o con estrías rojas,
- a las hojas adultas enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en V o U, dientes grandes, largos en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz u ocasionalmente alabeado, con hinchazón fina, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0.1

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	237	176	180	256	248	235	255
Allele 2	147	236	249	186	186	262	254	237	255

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Muscat Bleu posee un porte semi-erguido. Esta variedad presenta un vigor moderado y es preferible plantarla en terrenos con una fertilidad suficiente. Puede sufrir millerandaje o corredura en caso de condiciones climáticas adversas en el momento de la floración.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Muscat Bleu lleva el número 1293.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, como la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Muscat Bleu son de tamaño mediano y bastante abiertos. Las bayas son medianas a grandes, de sabor ligeramente amoscatedado, poco ácidas, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Muscat Bleu tolera bien el mildiu y el oídio, pero debe injertarse. A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015. Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Cépages, principales variétés de vigne cultivées en Suisse. Ph. Dupraz et J.-L. Spring, 2010, Ed. Agroscope, Suiza.
- Cépages suisses, histoires et origins, J. Vouillamoz, 2017, Ed. Favre, Lausana, Suiza.
- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Alemania.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*