

# Beaugaray N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA y la SICAREX Beaujolais en los años '80 y procede de un cruce entre el Gamay y el Heroldrebe.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Beaugaray

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Beaugaray está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2014, en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven con densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde amarillento, con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo violáceo en la cara dorsal, con nudos achatados y yemas con una pigmentación antocianica intensa de las escamas,
- a las hojas adultas pentagonales, enteras o de tres a cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado, de lóbulos muy superpuestos, dientes cortos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano, con hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y una densidad nula de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	178	194	246	238	216	249
Allele 2	141	238	249	186	204	260	254	259	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Beaugaray es bastante vigoroso, moderadamente fértil y con un porte semi-erguido. Esta variedad puede ser sensible al millerandaje.


### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Beaugaray lleva el número 1269.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Potencial tecnológico

Los racimos del Beaugaray son de tamaño mediano y compactos. Las bayas también son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda y muy jugosa. Los vinos presentan un buen color, son estructurados y tánicos. Posee un perfil aromático afrutado (frutas maduras) y floral (rosa y violeta).

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Beaugaray se muestra sensible al oídio y al mildiu y parece ser más resistente a la podredumbre gris. Esta variedad es sensible a las enfermedades de la madera (yesca).

## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*