

# Goron de Bovernier N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es originaria de Suiza. Según los estudios genéticos realizados, estaría emparentada con el Cornalin du Valais.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Goron de Bovernier

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Goron de Bovernier está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2014, en la lista B.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula a baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, de tres, cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar en V abierto a poco abierto, dientes poco numerosos y cortos en relación a su ancho en la base, de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo ocasionalmente con bordes hacia el haz, con hinchazón leve y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja a media de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

|          | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131                | 225   | 239   | 186    | 194     | 248     | 240    | 227    | 239    |
| Allele 2 | 149                | 225   | 247   | 186    | 194     | 260     | 262    | 243    | 261    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Goron de Bovernier es una variedad vigorosa y de porte semi-erguido a horizontal. Es sensible a la carencia en magnesio.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Goron de Bovernier lleva el número 1350.

### Fenología

época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas a 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Goron de Bovernier son de tamaño mediano y compactos. Las bayas son pequeñas a medianas, de sabor simple, con un pellejo fino. Produce unos vinos aromáticos, moderadamente alcohólicos y con una acidez total bastante elevada.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Goron de Bovernier es muy sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Principales variétés de vigne cultivées en Suisse. Ph. Dupraz y J-L. Spring, 2010, Ed. Agroscope, Suiza.
- Origine des cépages valaisans et valdotains. J. Vouillamoz y G. Moriondo, 2011, Ed. Belvédère, Suiza.
- Cépages suisses, histoires et origines. J. Vouillamoz, 2017, Ed. Favre, Suiza.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*