

Xinomavro N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Grecia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Xinomavro

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Xinomavro está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015, en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Grecia.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde amarillento,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, enteras, con un seno peciolar cerrado, superpuesto, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, ondulado entre los nervios y ocasionalmente abultado, con hinchazón moderada a intensa y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada y con gran presencia de pruina.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	249	176	194	238	238	227	249
Allele 2	131	232	249	178	204	252	240	243	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Xinomavro es una variedad vigorosa, fértil, con un porte semi-erguido a erguido. Se recomienda manejarse en poda corta y cultivarse en terrenos ligeros y con una fertilidad limitada para producir vinos tintos. Como es una variedad un poco tardía, precisa temperaturas elevadas durante la temporada y un control adecuado de la poda y de la colocación en espaldera para alcanzar el punto de maduración óptimo. El Xinomavro también puede ser sensible a la carencia de potasio y boro.


Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Xinomavro lleva el número 1255.

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 5 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos de Xinomavro son medianos y las bayas también con una pulpa jugosa. Los vinos se caracterizan por una acidez bastante elevada, taninos presentes y un color moderado. Esta variedad puede producir una paleta de vinos variada, desde un rosado ligero y aromático a un vino tinto tánico, robusto y apto para el envejecimiento en barrica. Gracias a su nivel de acidez, el Xinomavro también es apto para la elaboración de vinos espumosos de tipo «blanc de noir». Unos rendimientos demasiado elevados o una maduración insuficiente pueden dar lugar a unos vinos desequilibrados. Los aromas típicos de los vinos elaborados con Xinomavro son complejos y con presencia de frutos rojos y especias.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Xinomavro se muestra sensible al mildiu, al oídio y a la podredumbre gris.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Ampélographie hellénique. B. Krimbas, 1943, Grecia.
- Plaquettes Hellenifera. K. Bakasietas, S. Petropoulos y G. Tavaditis, 2019, Grecia.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*