

Robin noir N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es autóctona del viñedo alpino. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, el Robin noir podría ser el resultado de un cruce entre la Mondeuse blanche y el Tressot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Robin noir

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Salagnin» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Robin noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color verde, con ribete carmíneo, que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, de color verde con zonas bronceadas, con una densidad muy baja a baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes u orbiculares, enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores moderadamente profundos y estrechos, un seno peciolar abierto en V o U, dientes pequeños a medianos de largo medio a elevado en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y un lado convexo, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón, ligeramente abultado y ocasionalmente plisado en el peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica o, a veces, redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	194	256	238	216	239
Allele 2	137	229	260	186	200	260	240	257	261

Cultivo y habilidades agronómicas

El Robin noir es una variedad vigorosa, productiva y de porte semi-erguido a erguido. A veces es sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Robin noir son pequeños a medianos, a veces con alas y compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa. Las bayas poseen un buen potencial de acumulación de azúcares, pero son poco ácidas. El Robin noir produce vinos con color y tánicos, aptos para el envejecimiento.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Robin noir es muy sensible al mildiu, pero es poco sensible al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.

- Le vignoble. A. Mas y V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*