

# Robin noir N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad es autóctona del viñedo alpino. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, el Robin noir podría ser el resultado de un cruce entre la Mondeuse blanche y el Tressot.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Robin noir

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Salagnin» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Robin noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2015, en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color verde, con ribete carmíneo, que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, de color verde con zonas bronceadas, con una densidad muy baja a baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes u orbiculares, enteras, de tres o cinco lóbulos, con senos laterales superiores moderadamente profundos y estrechos, un seno peciolar abierto en V o U, dientes pequeños a medianos de largo medio a elevado en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y un lado convexo, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón, ligeramente abultado y ocasionalmente plisado en el peciolo y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica o, a veces, redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

1

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	194	256	238	216	239
Allele 2	137	229	260	186	200	260	240	257	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Robin noir es una variedad vigorosa, productiva y de porte semi-erguido a erguido. A veces es sensible al millerandaje.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Robin noir son pequeños a medianos, a veces con alas y compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa. Las bayas poseen un buen potencial de acumulación de azúcares, pero son poco ácidas. El Robin noir produce vinos con color y tánicos, aptos para el envejecimiento.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Robin noir es muy sensible al mildiu, pero es poco sensible al oídio.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia..

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.

- Le vignoble. A. Mas y V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*