

Bouchalès N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad parece ser originaria del valle del Garona.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Bouchalès

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Bouchalès está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, de gran tamaño, enteras de tres o cinco lóbulos con un seno peciolar poco abierto o cerrado, dientes de lados convexos, un limbo alabeado, con hinchazón y ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	4972	4442	1383	487	212	149	62

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	176	188	252	238	233	239
Allele 2	131	238	253	186	200	252	240	247	251

Potencial tecnológico

ligeros y bastante ordinarios.

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño

vinos con poco color, de baja grado, generalmente

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

mediano. Esta variedad muy productiva produce unos

Esta variedad se muestra poco sensible al mildiu y al

oídio. Por el contrario, es bastante sensible al black

Cultivo y habilidades agronómicas

El Bouchalès es una variedad abundante, muy vigorosa. Su producción es elevada y regular. Se considera sensible al viento, lo que puede ocasionar una rotura importante de los pámpanos.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Bouchalès lleva el número 406.


Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


.

Debourrement



rot.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier