

Raisaine B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Cévennes d'Ardèche. Los análisis genéticos realizados en Montpellier muestran que sería el resultado de un cruce entre el Ribier noir y el Grec rouge.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Raisaine

Sinonimia

La Raisaine (o el Raisaine) no tiene ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, la Raisaine está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2016 en la lista A y clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven con ribete carmíneo, que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde/amarillo con zonas bronceadas, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos cortos de color rojo o de estrías rojas,
- a las hojas adultas cuneiformes u orbiculares, de cinco lóbulos, con senos laterales superiores profundos con fondo en V, un seno peciolar en V o en llave, abierto a poco abierto, dientes medianos en relación a su base, de lados rectilíneos o con un lado cóncavo y un lado convexo, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo grueso, verde oscuro, alabeado, ocasionalmente con bordes hacia el haz, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada, con lenticelas pardas bastante numerosas en la superficie.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0.1

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	178	194	244	240	245	261
Allele 2	131	234	249	182	204	252	240	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La Raisaine es vigorosa, productiva y con un porte semi-erguido o erguido. Se puede manejar en poda corta.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Raisaine lleva el número 1297.

Fenología

época de desborre: 4 días antes de la variedad Chasselas.
época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de la Raisaine son de tamaño mediano y compactos. Las bayas son medianas a grandes, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio, con gran presencia de pruina y con una pulpa jugosa y firme. Sus vinos están marcados por la redondez y la fluidez, con una acidez baja. Los aromas dominantes son la miel y el membrillo. En otro tiempo, también se podía utilizar como uva de mesa.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Raisaine es sensible al mildiu y un poco menos al oídio.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Le vignoble. A. Mas y V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*