

Silara N

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.



Origen

El Silara es un híbrido interespecífico obtenido por Seibel. Su parentela se desconoce.

Usar

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.

Nombre de la variedad en Francia

Silara

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «10796 Seibel» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Silara está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2017, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven con un ribete carmíneo, con una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde/amarillo, con una densidad media de pelos tumbados y baja de pelos erguidos,
- a los pámpanos herbáceos finos, de color rojo,
- a las hojas adultas pequeñas, enteras o de cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto en V, dientes de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos o con un lado convexo y un lado cóncavo, nervios principales alargados en estrella (con los cinco dientes correspondientes, salientes y netamente más largos en relación a su base que los demás), una pigmentación antocianica baja a media de los nervios, un limbo brillante, con bordes hacia el haz, plisado, ligeramente abultado, con hinchazón gruesa y, en el envés del limbo, una densidad baja a muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o achatada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	122	219	249	191	186	252	248	243	249
Allele 2	147	248	249	191	194	252	254	247	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Silara posee un porte horizontal a semi-erguido y un aspecto deshojado. Esta variedad es fértil y produce gran cantidad de racimos pequeños, que casi pueden representar una segunda cosecha. El Silara es sensible a la carencia de potasio y a la clorosis.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Silara lleva el número 1248.

Fenología

Época de desborre: 13 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Silara son pequeños a medianos y moderadamente compactos. Las bayas son medianas, de sabor ligeramente foxé, con un pellejo de grosor medio y una pulpa carnosa. Los mostos de Silara poseen un buen potencial de color, con una acidez marcada y contenidos moderados en azúcares.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Silara es sensible al oídio y moderadamente sensible a la excoriosis. Esta variedad es bastante resistente a los cicadélidos de la vid y a la erinosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*