

# Carubis N

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.



## Origen

El Carubis es un híbrido interespecífico obtenido por Galibert. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Villard blanc (12375 Seyve-Villard) y el Carignan.

## Usar

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.

## Nombre de la variedad en Francia

Carubis

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "21-1 Galibert" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Carubis está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2017, en la lista A.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color cobrizo rojizo, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, grandes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar en U cerrado, a veces limitado de un lado por un nervio cerca del peciolo, dientes grandes, de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media a elevada de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	237	178	179	260	254	235	251
Allele 2	141	234	239	186	188	262	254	257	255

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Carubis es una variedad muy vigorosa y con un porte horizontal a semi-erguido. Esta variedad puede presentar síntomas de carencia de magnesio y puede ser sensible a la corredura.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Carubis lleva el número 1245.

### Fenología

época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Carubis son grandes, moderadamente o poco compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo grueso y una pulpa jugosa. Los zumos son ricos en polifenoles y poseen un color intenso.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Carubis es sensible al mildiu y a los cicadélidos de la vid. Por el contrario, tolera bien la erinosis.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*