

Carubis N

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.



Origen

El Carubis es un híbrido interespecífico obtenido por Galibert. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Villard blanc (12375 Seyve-Villard) y el Carignan.

Usar

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.

Nombre de la variedad en Francia

Carubis

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "21-1 Galibert" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Carubis está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2017, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color cobrizo rojizo, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, grandes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar en U cerrado, a veces limitado de un lado por un nervio cerca del peciolo, dientes grandes, de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media a elevada de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	237	178	179	260	254	235	251
Allele 2	141	234	239	186	188	262	254	257	255

Cultivo y habilidades agronómicas

El Carubis es una variedad muy vigorosa y con un porte horizontal a semi-erguido. Esta variedad puede presentar síntomas de carencia de magnesio y puede ser sensible a la corredura.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Carubis lleva el número 1245.

Fenología

época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Carubis son grandes, moderadamente o poco compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo grueso y una pulpa jugosa. Los zumos son ricos en polifenoles y poseen un color intenso.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Carubis es sensible al mildiu y a los cicadélidos de la vid. Por el contrario, tolera bien la erinosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*