

Artaban N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad Artaban fue obtenida por el INRA y el Julius Kühn Institut. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre un descendiente de *Muscadinia rotundifolia* y el Regent.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Artaban

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Artaban está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco lóbulos con senos laterales superiores con fondo en V y de lóbulos ligeramente superpuestos, un seno peciolar en V, cerrado o con bordes paralelos en prolongación del nervio central, dientes medianos en relación a su base, de lados rectilíneos, una ligera pigmentación antocianica de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, poco abultado, con hinchazón moderada y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada, con pruina moteada y ausente en el ombligo.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

4.9

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	200	260	240	243	239
Allele 2	149	223	253	186	204	260	248	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Artaban posee un vigor medio y tiene un porte semi-erguido. Es muy sensible a la carencia de magnesio y puede presentar un enrojecimiento intenso del follaje en otoño, así como algunas dificultades de agostamiento por su interrupción del crecimiento vegetativo tardío.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Artaban lleva el número 1267.

Fenología

época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Artaban son grandes, de forma cónica y compactos. Las bayas son pequeñas, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa blanda y jugosa. Los vinos obtenidos del Artaban son ligeros, con buen color, destinados a un consumo rápido y dominados por aromas afrutados.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Artaban es resistente al mildiu y al oídio. Por el contrario, es sensible al black rot y un poco sensible a la podredumbre gris. En situaciones de riesgo, la protección con fungicidas sigue siendo indispensable.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Ficha varietal Artaban, C. Schneider, 2018.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*