

# Petite Sainte-Marie B

Variedad de uva de vino.



## Origen

La Petite Sainte-Marie es una variedad tradicional de los viñedos de Saboya. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad estaría directamente emparentada con el Gouais blanco.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Petite Sainte-Marie

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, la Petite Sainte-Marie está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificada.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde-amarillo con zonas bronceadas, con una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo o de estrías rojas,
- a las hojas adultas orbiculares o cordiformes, de color verde claro, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar en V, cerrado con bordes paralelos, dientes bastante grandes, de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes ligeramente hacia el haz o alabeado, con hinchazón, abultado, a veces ondulado entre los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	249	176	194	238	238	216	239
Allele 2	149	232	260	186	204	260	262	245	249

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Petite Sainte-Marie posee un porte semi-erguido a erguido. Esta variedad es sensible a la carencia de potasio y presenta una gran incidencia de millerandaje.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Petite Sainte-Marie lleva el número 1299.

### Fenología

época de desborre: como la variedad Chasselas.  
época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos de la Petite Sainte-Marie son pequeños a medianos, cilíndricos y moderadamente compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con gran presencia de pruina, con un pellejo fino y una pulpa jugosa. Los vinos poseen aromas expresivos, con notas florales y melosas. En boca, según el nivel de maduración, pueden ser ligeros y vivos o ricos y equilibrados.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Petite Sainte-Marie presenta más sensibilidad al oídio que al mildiu, pero es poco sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Le dictionnaire des noms de cépages de France. P. Rézeau, Ed. CNRS, 1998, Paris, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*