

# Vidoc N

Variedad de uva de vino.



## Origen

La variedad Vidoc fue obtenida por el INRA y el Julius Kühn Institut. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el INRA 3082-1-42 y el Regent.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Vidoc

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Vidoc está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad muy baja a baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos alargados de estrías rojas, nudos aplanados y una sección acanelada,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar abierto a poco abierto, en V o en U, dientes largos a muy largos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

5.1

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	200	252	240	227	239
Allele 2	151	229	253	182	204	260	240	233	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Vidoc es una variedad vigorosa, fértil o de porte horizontal a rastro. Su manejo precisa una cuidada colocación en espaldera. El Vidoc es muy sensible a la carencia de magnesio. Puede presentar algunas dificultades de agostamiento por su interrupción tardía del ciclo vegetativo.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Vidoc lleva el número 1268.

### Fenología

época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Vidoc son medianos y compactos. Las bayas son pequeñas a medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda y jugosa. Los vinos son vigorosos, con color y equilibrio adecuados y una acidez correcta. Los aromas dominantes son las frutas y las especias.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Vidoc es resistente al mildiu y al oídio, pero es sensible al black rot. También es bastante tolerante a la podredumbre gris. En situaciones de riesgo, la protección con fungicidas sigue siendo indispensable.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

- Ficha varietal Vidoc. INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*