

Vidoc N

Variedad de uva de vino.



Origen

La variedad Vidoc fue obtenida por el INRA y el Julius Kühn Institut. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el INRA 3082-1-42 y el Regent.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Vidoc

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Vidoc está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad muy baja a baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos alargados de estrías rojas, nudos aplanados y una sección acanelada,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar abierto a poco abierto, en V o en U, dientes largos a muy largos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma achatada o redondeada.

Evolución de las superficies de cepa-madre

Año

2018

ha

5.1

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	200	252	240	227	239
Allele 2	151	229	253	182	204	260	240	233	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Vidoc es una variedad vigorosa, fértil o de porte horizontal a rastro. Su manejo precisa una cuidada colocación en espaldera. El Vidoc es muy sensible a la carencia de magnesio. Puede presentar algunas dificultades de agostamiento por su interrupción tardía del ciclo vegetativo.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Vidoc lleva el número 1268.

Fenología

época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Vidoc son medianos y compactos. Las bayas son pequeñas a medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda y jugosa. Los vinos son vigorosos, con color y equilibrio adecuados y una acidez correcta. Los aromas dominantes son las frutas y las especias.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Vidoc es resistente al mildiu y al oídio, pero es sensible al black rot. También es bastante tolerante a la podredumbre gris. En situaciones de riesgo, la protección con fungicidas sigue siendo indispensable.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- [Ficha varietal Vidoc](#), C. Schneider, 2018.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*