

Brachet N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es específica a los viñedos de Alpes Marítimos.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Brachet

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Braquet" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Brachet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas de siete lóbulos con senos laterales con fondo en U y lóbulos superpuestos, un seno peciolar abierto, dientes largos con lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón, abultado, con bordes ligeramente hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	11	18	33	6	11	13

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	243	237
Allele 2	133	223	249	182	200	260	254	257	255

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad debe cultivarse en terrenos cálidos, secos y poco fértiles. Precisa una poda corta y tutores suficientes.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Brachet lleva el número 1365. Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en el viñedo de Bellet (Alpes Marítimos).

Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas son de tamaño mediano. En general, los vinos de Brachet suelen estar bien valorados, son finos y aromáticos. No obstante, suelen presentar carencias de color, por eso, el rendimiento debe estar especialmente limitado a fin de evitar este inconveniente.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Brachet es muy sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*