


Négret pounjut N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Négret pounjut es, sin duda, originario del valle del Garona, de los viñedos de Fronton y de Lavilledieu. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, estaría directamente emparentada con el Prunelard.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Négret pounjut

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Négret pounjut está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2020, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales profundos, con un fondo plano y que suele presentar un diente en el fondo, un seno peciolar cerrado con lóbulos superpuestos o muy superpuestos, dientes de largo medio a elevado en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón fina y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica u ovoide y que presentan una punta en la extremidad, a la altura del ombligo.

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	223	239	176	188	240	254	233	249
Allele 2	149	236	262	182	202	260	262	267	251

Cultivo y habilidades agronómicas

El Négret pounjut posee un porte semi-erguido. Esta variedad es muy vigorosa, pero poco fértil, por tanto, es preferible manejarla en poda larga.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

época de desborre: como la variedad Chasselas.

época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Négret pounjut son pequeños y moderadamente compactos. Las bayas son pequeñas a medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa jugosa. Las bayas presentan un potencial bajo de acumulación de azúcares y ácidos. Los vinos tintos elaborados a partir de Négret pounjut son ligeros, de color pálido, afrutados (fresa) y con taninos muy suaves. Permite elaborar también vinos rosados.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es particularmente sensible al oídio. Es también sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Cépages du Sud-Ouest, 2000 ans d'histoire. G. Lavignac, 2001, Ed. Rouergue/INRA, Francia.
- Cépages oubliés des Pyrénées. Projet Interreg Poctefa Valovitis, 2019, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*