

# Vintaghju N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad sería autóctona de Haute-Corse.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Vintaghju

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Vintaghju está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2020, en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco con ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados entre los nervios,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas y zarcillos largos a muy largos,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales superiores bastante profundos, abiertos con fondo en U, un seno peciolar abierto en U, con fondo a veces limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes pequeños a medianos, de largo mediano a elevado en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo verde oscuro, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a los racimos largos, en ocasiones estriados con extremidades bífidas,
- a las bayas de forma redondeada.

# Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	233	178	196	240	238	233	261
Allele 2	149	229	247	186	204	260	254	243	271

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Vintaghju es poco fértil. Posee un porte semi-erguido a horizontal y produce pámpanos largos que precisan colocarse en espaldera. Esta variedad también puede ser sensible al millerandaje.

## Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Vintaghju lleva el número 1338.

Se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 6 clones en Córcega.

## Fenología

época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


## Potencial tecnológico

Los racimos del Vintaghju son grandes y muy compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino, con un poco de pruina y una pulpa muy jugosa. Los vinos presentan una buena acidez y los taninos están bastante presentes. Su color puede ser excelente, rojo vino sostenido. El perfil aromático de los vinos se articula en torno a los frutos negros y las especias.


## Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es sensible a la podredumbre gris y a la yesca.

## Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Corse, 2016, San Giuliano, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*