

# Aladin N

### Variedad ornamental para aficionados.



### Origen

Esta variedad se obtuvo en 1979 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

### Usar

Variedad ornamental para aficionados.

#### Nombre de la variedad en Francia

Aladin

#### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Aladin está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares de color verde oscuro, de tres, cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, poco abierto o cerrado con bordes superpuestos, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios, un limbo liso, ligeramente abultado y con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

## Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año 2018
ha 0

## Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	182	192	240	236	235	255
Allele 2	147	236	260	186	202	262	248	243	271

Potencial tecnológico

simple.

debe injertarse.

Los racimos del Aladin son medianos a grandes,

a medianas, jugosas, con una piel gruesa y sabor

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Aladin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la

antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero

moderadamente compactos y las bayas son pequeñas

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Aladin posee un vigor medio. Es una variedad bastante fértil con un porte horizontal. El Aladin se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalizada.

### Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Aladin Ileva el número 5001.

### Fenología


Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

## Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier