

Aladin N

Variedad ornamental para aficionados.



Origen

Esta variedad se obtuvo en 1979 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

Usar

Variedad ornamental para aficionados.

Nombre de la variedad en Francia

Aladin

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Aladin está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares de color verde oscuro, de tres, cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, poco abierto o cerrado con bordes superpuestos, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo liso, ligeramente abultado y con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	182	192	240	236	235	255
Allele 2	147	236	260	186	202	262	248	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Aladin posee un vigor medio. Es una variedad bastante fértil con un porte horizontal. El Aladin se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalizada.

Potencial tecnológico

Los racimos del Aladin son medianos a grandes, moderadamente compactos y las bayas son pequeñas a medianas, jugosas, con una piel gruesa y sabor simple.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Aladin lleva el número 5001.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Aladin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse.

Fenología


Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*