

Brun argenté N

Variedad de uva de vino.







Origen

Esta variedad es originaria del sudeste de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Brun argenté

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Vaccarèse" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Brun argenté está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco lóbulos con un seno peciolar poco abierto, dientes largos respecto al ancho en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula o muy baja de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	70	55	44	34	11	10	12

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	176	188	248	238	247	239
Allele 2	141	223	249	178	200	256	266	267	249

Cultivo y habilidades agronómicas

El Brun argenté es una cepa tardía, fértil y que debe podarse en corto. Es preferible plantarlo en terrenos bastante pobres, cálidos y bien expuestos. Es sensible al milleranje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Brun argenté lleva el número 1164. En 2001, se llevó a cabo una plantación de una decena de clones en un conservatorio en Côtes du Rhône. Se han llevado a cabo trabajos de selección a partir de este conservatorio.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son muy grandes. El Brun argenté produce unos vinos de color deficiente o moderado y bajo grado. Los vinos son equilibrados, con un perfil aromático complejo (notas afrutadas y especiadas).

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Brun argenté es muy sensible al oídio y a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 10 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier