

Nuevo

Patricia INTA Rs

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.



Origen

Esta variedad mesa fue obtenida en la Estación INTA de Mendoza (Argentina) por A. Gargiulo mediante el cruce entre el Moscatel rosado con un descendiente de Gibi y Sultanine.

Usar

Variedad destinada a la elaboración de zumo de fruta.

Nombre de la variedad en Francia

Patricia INTA

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Serna INTA está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2020, en la lista A.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde, con una densidad baja de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color verde,
- a las hojas adultas bastante grandes de cinco lóbulos, con senos laterales inferiores poco profundos, un seno peciolar abierto en U o en V, dientes pequeños a medianos, de largo medio en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo alabeado, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los racimos frondosos, largos y con frecuencia estriados,
- a las bayas de forma elíptica y de color amarillo rosado al madurar.

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	143	225	249	176	188	256	240	257	255
Allele 2	149	232	253	191	204	258	248	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Patricia INTA posee un porte semi-erguido. En condiciones favorables, esta variedad es muy productiva y ofrece rendimientos elevados. Es sensible a la carencia en magnesio.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Patricia INTA lleva el número 1364.

Fenología

época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 3ª época, 5 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Patricia INTA son grandes a muy grandes, alargados y moderadamente compactos. Las bayas son apirenas, medianas, de sabor ligeramente amoscateado, con un pellejo fino. La coloración rosada de las bayas solo se alcanza con la maduración total. Cuando las pepitas están presentes, son blandas y muy poco perceptibles.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Patricia INTA es muy sensible al mildiu.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*