

Nuevo

# Enfariné noir N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Enfariné noir es originario del Noreste de Francia y tradicional de los viñedos del Jura. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería probablemente una descendiente del Gouais blanc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Enfariné noir

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Enfariné noir está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2020, en la lista A y está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, que es blanca con ribete carmíneo y presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de tamaño medio, con tres o cinco lóbulos, senos laterales superiores profundos y generalmente abiertos, planos o en forma de U en la base, a menudo con un diente en la base, un seno peciolar poco abierto o cerrado y dientes bastante grandes, de longitud media a larga en relación a su anchura en la base, con lados rectilíneos, pigmentación antocianica de baja a media de los nervios, limbo involuto de color verde oscuro y, en el envés, baja densidad de pelos tumbados y de elevada a muy elevada densidad de pelos erguidos, sobre todo en los nervios,
- a las bayas que son de forma esférica y con gran cantidad de pruina (de aspecto blanco grisáceo, de ahí el nombre dado a esta variedad).

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	2018
ha	90	56	6	0.1

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	178	194	240	238	233	251
Allele 2	149	232	249	182	204	244	262	245	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Enfariné noir es una variedad bastante tardía, fértil, de producción regular, poco sensible a la corredura y de vigor medio. De preferencia debe manejarse en poda corta o poda larga moderada. Tiene un porte semi-erguido y debe ser empalizado. Se adapta bien a los terrenos calcáreos o con marga. Es bastante resistente a las heladas invernales, pero su follaje es susceptible a los golpes de sol.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son de tamaño medio, cilíndricos, a menudo alados y compactos, con un pedúnculo herbáceo largo y bastante frágil. Las bayas también son medianas, con pellejo bastante grueso y pulpa jugosa de sabor un poco áspero. Los vinos son tánicos y bastante astringentes, con un buen potencial de acidez y de guarda. Por tanto, en el contexto del cambio climático, esta variedad presenta características que pueden ser interesantes para el ensamblaje.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

[Traducción en curso]

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Monographie des cépages de l'Aube. J. Guicherd, 1905, Ed. Nouei, Troyes, Francia.
- Les vignobles du Jura et de la Franche-Comté. Ch. Rouget, 1897, Ed. Cote. Lyon, Francia.
- Le vignoble. A. Mas y V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*