

Nuevo

Gueuche noir N

Variedad de uva de vino.







Origen

El Gueuche noir es originario de los viñedos de los departamentos de Franche-Comté y Ain. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería probablemente una descendiente del Gouais blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Gueuche noir

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Gueuche noir está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificada.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad elevada de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de tamaño de pequeño a mediano, con tres o cinco lóbulos con senos laterales largos con base en U, un seno peciolar en forma de lira abierta, dientes medianos con lados rectilíneos y convexos, nervios verdes, un limbo grueso, plano o ligeramente revoluto, con una hinchazón gruesa, abultado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad de media a elevada de pelos tumbados y pelos erguidos,
- a las bayas que son de forma redondeada.

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	249	178	196	244	248	235	249
Allele 2	149	238	262	186	204	246	254	245	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Gueuche noir es una variedad productiva y con porte erguido. Tras una helada de primavera, los rebrotes son fértil y esta variedad es poco susceptible la corredura.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. Un conservatorio de tres clones fue plantado en el Jura.

Potencial tecnológico

Los racimos de Gueuche noir son medianos y bastante compactos. Las bayas son de tamaño medio, de sabor neutro y con un pellejo fino. Los vinos son de color claro y pueden ser duros y bastante ácidos.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Gueuche noir es sensible a las enfermedades criptogámicas, en particular a la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier