

Cabernet franc N

Variedad de uva de vino.







Origen

Con toda probabilidad, el Cabernet franc es originario del sudoeste de Francia.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Cabernet franc

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Cabernet franc está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y República Checa.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color verde rojizo y con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar de lóbulos ligeramente superpuestos, senos laterales con un diente bastante frecuente en el fondo, dientes medianos con lados rectilíneos, un limbo martillado, brillante y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	9743	17864	22606	30256	35163	38691	32676

Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	178	194	248	238	227	239
Allele 2	145	238	262	186	204	260	254	235	257

Cultivo y habilidades agronómicas

De vigor bastante importante, esta variedad debe manejarse en poda larga moderada o, eventualmente, en poda corta en las zonas climáticas más favorables. En lo que se refiere a la tierra, los mejores resultados suelen obtenerse en suelos arcilloso-calcáreos, pero también puede ofrecer resultados óptimos en suelos arenosos, en ausencia de estrés hídrico.

Selección clonal en Francia

Los treinta y uno clones de Cabernet franc llevan los números 210, 211, 212, 213, 214, 215, 326, 327, 332, 393, 394, 395, 396, 407, 408, 409, 542, 543, 544, 545, 622, 623, 678, 1156, 1158, 1166, 1167, 1203, 1204 y 1311. Un conservatorio de 100 clones fue instalado en los viñedos de Anjou en 2001. Otro conservatorio con más de 100 clones se instaló en el viñedo bordelés 2003 y 2004; es el resultado de las prospecciones realizadas en Gironda y en el piedemonte pirenaico.

Potencial tecnológico

Los racimos son medianos y las bayas son de pequeño tamaño. Esta variedad permite elaborar unos vinos aromáticos de calidad y con un potencial de guarda medio. Por el contrario, los potenciales de 'azúcar', 'acidez' y 'polifenoles' (intensidad colorante y estructura tánica) son moderados.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Cabernet franc tolera moderadamente la podredumbre gris y su sensibilidad frente a la eutipiosis y la yesca es media. Es bastante sensible a los cicadélidos.


Fenología

época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas. época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier